

Nødprocedurer

- » Nødudstyr, som atropin og adrenalin skal altid være tilgængeligt.
- » Dyr lægen skal være i stand til at behandle almindelige anæstesi-komplikationer og foretage hjertelungeredning.

For mere information henvises til : <https://ava.eu.com/resources/checklists/>

FAGGRUPPE FAMILIEDYRS ANBEFALINGER VED ANÆSTESI AF FAMILIEDYR



Ovenstående er Faggruppens vejledende retningslinjer og anbefalinger, og kan ikke betragtes som fyldestgørende og udtømmende veterinærfaglig rådgivning i konkrete behandlinger. DDD påtager sig således intet ansvar i så henseende.



Patientsikkerhed har altid første prioritet

Analgesi

- » Patienten bør smerteevalueres og smertelindres før, under og efter operationen.
- » Der bør udarbejdes en individuel smertebehandlingsplan for hver patient.
- » Der bør anvendes multimodal analgesi med bl.a. opioider, lokalanalgetika & NSAIDs.

Patientbehandling

- » Temperaturovervågning bør foretages under operationen og temperaturunderstøttende behandling, som f.eks. varmemåtter, bør være til rådighed og benyttes for at opretholde normal kropstemperatur hos patienten under proceduren.
- » Behov for væsketerapi evalueres og anvendes hvor indiceret.

Anæstesiplanlægning

- » En anæstesiplan bør tilrettelægges for hver enkelt patient under hensyntagen til patientens og procedures risikofaktorer.
- » Tubus bør være til rådighed.
- » Manuel eller mekanisk ventilation bør være til rådighed og anvendes ved behov.
- » Behov for ventilationsstøtte bør overvejes ved planlægning af anæstesi.
- » Der bør være gjort klar til IV-adgang (venflon) forud for generel anæstesi.
- » Overvågningsudstyr f.eks. stetoskop og pulsoximeter bør være til rådighed og anvendes.

Anæsthesiprocedure

- » Præanæstetisk sedation tilpasset det enkelte dyrs behov og tilstand bør anvendes for at give patienten en rolig og sikker overgang til generel anæstesi.
- » Sederede og bedøvede dyr skal tilledes iltberiget luft.
- » Ved tandbehandlingsprocedurer skal dyret være intuberet.
- » Der bør foretages løbende monitorering af vitalparametre hos patienter under generel anæstesi.
- » Patienter bør monitoreres løbende under opvågningsfasen.